



Retire la funda protectora girando con suavidad y tirando longitudinalmente de ella. Procure no doblar la aguja. No intente volver a colocar la funda protectora ya que podría dañarse la punta de la aguja.



Desinfecte la zona elegida para la administración de la inyección con un algodón impregnado con alcohol o cualquier otro desinfectante. Forme un pliegue cutáneo en la zona de administración.



Las jeringas precargadas están listas para usar, por lo que es recomendable no purgar el líquido contenido en la jeringuilla.



Sin soltar el pliegue cutáneo, coloque la jeringa perpendicular al mismo, e introduzca la aguja completamente.



El lugar de inyección es el tejido celular subcutáneo en la cintura abdominal o en la zona lateral del vientre. Cada día alterne el lugar de inyección, utilizando el lado contrario de la cintura en el que lo inyectó el día anterior.



Inyecte lentamente el contenido de la jeringa, presionando con suavidad el émbolo para facilitar la absorción del medicamento. Mantenga el pliegue cutáneo hasta el final de la inyección y la extracción de la aguja. No frotar la zona después de la inyección.

NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN SUBCUTÁNEA DE HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR

**Su médico le ha recetado un
tratamiento para prevenir o tratar la
enfermedad tromboembólica venosa.**

**Para asegurar la mayor protección
es importante que cumpla
íntegramente sus indicaciones
y la duración del tratamiento.**

**A continuación se describen los
pasos a seguir para una correcta
administración.**

Este servicio es cortesía de



Laboratorios ROVI, S.A.
Julián Camarillo, 35 • 28037 Madrid
www.rovi.es